

Polos Olímpicos de Treinamento Intensivo (POTI)
Curso de Teoria dos Números - Nível 2

Aula 2 - Divisibilidade II

Prof. Samuel Feitosa

Arquivo Original¹

¹**Documento:** "...gaia/educacional/matematica/pot2tn02/Aula02-DivisibilidadeII.pdf".

Sumário

1	Divisibilidade II	1
1.1	Problemas Propostos	3
1.2	Dicas e Soluções	3
1.3	Referências	5

1 Divisibilidade II

Definição 1. *Dados dois inteiros a e b , com $a \neq 0$, dizemos que a divide b ou que a é um divisor de b ou ainda que b é um múltiplo de a , e escrevemos $a \mid b$ se o r obtido pelo algoritmo de divisão aplicado à a e b é 0, ou seja, se $b = aq$ para algum inteiro q .*

Lema 2. *Sejam a, b, c, d inteiros. Temos*

- i) (“ d divide”) *Se $d \mid a$ e $d \mid b$, então $d \mid ax + by$ para quaisquer x e y inteiros.*
- ii) (“Limitação”) *Se $d \mid a$, então $a = 0$ ou $|d| \leq |a|$.*
- iii) (Transitividade) *Se $a \mid b$ e $b \mid c$, então $a \mid c$.*

Em particular, segue da propriedade i) que $d \mid a + b$ e $d \mid a - b$.

Exemplo 3. *(Olimpíada de Maio 2006) Encontre todos os naturais a e b tais que $a \mid b + 1$ e $b \mid a + 1$.*

Pela propriedade da Limitação, temos $a \leq b + 1$ e $b \leq a + 1$. Daí, $a - 1 \leq b \leq a + 1$.

Vejamos os casos:

(i) $a = b$. Como $a \mid b + 1$ e $a \mid b$ (pois $b = a$) temos que $a \mid [(b + 1) - b] = 1$. Assim, $a = 1$. Nesse caso, só temos a solução $(a, b) = (1, 1)$

(ii) $a = b + 1$. Como $b \mid a + 1$ e $b \mid a - 1$ (pois $b = a - 1$) temos que $b \mid [(a + 1) - (a - 1)] = 2$. Assim, $b = 1$ ou $b = 2$ e nesse caso, só temos as soluções $(3, 2)$ e $(2, 1)$.

(iii) $a = b - 1$. Esse caso é análogo ao anterior e as soluções para (a, b) são $(1, 2)$ e $(2, 3)$.

Exemplo 4. *(Critério de Divisibilidade por 7) Existem alguns métodos práticos para decidirmos se um número é múltiplo de outro. Certamente o leitor já deve ter se deparado com algum critério de divisibilidade. Existe um critério por 7 bastante popular: Para saber se um inteiro é múltiplo de 7, basta apagar seu último dígito, multiplicá-lo por 2 e o subtrair do número que restou. Se o resultado é múltiplo de 7, então o número original também é múltiplo de 7.*

Podemos aplicar esse algoritmo sucessivas vezes até que o resultado obtido seja facilmente verificável como um múltiplo de 7. Por exemplo, para o número 561421 podemos escrever:

$$\begin{aligned} 56142 - 2 &= 56140 \\ 5614 - 0 &= 5614 \\ 561 - 8 &= 553 \\ 55 - 6 &= 49 \end{aligned}$$

Como 49 é múltiplo de 7, nosso número original também é. Por que esse processo funciona? Se o nosso número original está escrito na forma $10a + b$, então o número obtido após a operação descrita é $a - 2b$. Basta mostrarmos que se $7 \mid a - 2b$, então $7 \mid 10a + b$. Se $7 \mid a - 2b$, pela propriedade (i) do lema, concluímos que $7 \mid 10a - 20b$. Como $7 \mid 21b$, também temos que $7 \mid [(10a - 20b) + 21b] = 10a + b$.

Exemplo 5. Mostre que se $7 \mid 3a + 2b$ então $7 \mid 4a - 2b$.

Veja que $7 \mid 7a$ e $7 \mid 3a + 2b$, então $7 \mid [7a - (3a + 2b)] = 4a - 2b$. Na prática, o que fizemos foi multiplicar o número $3a + 2b$ por algum inteiro para posteriormente subtraímos um múltiplo de 7 conveniente e obtermos o número $4a - 2b$. Existem outras formas de fazermos isso. Observe os números $3 \cdot 0, 3 \cdot 1, 3 \cdot 2, 3 \cdot 3, 3 \cdot 4, 3 \cdot 5, 3 \cdot 6$. O número $3 \cdot 6$ deixa o mesmo resto que 4 por 7, pois $3 \cdot 6 = 7 \cdot 2 + 4$. Como $7 \mid 3a + 2b$ podemos concluir que $7 \mid (18a + 12b)$ e conseqüentemente $7 \mid [18a + (12b - 14a)] = 4a + 12b$. Mas $7 \mid 14b$, então $7 \mid [4a + 12b - 14b] = 4a - 2b$.

Para o próximo exemplo, o leitor precisará lembrar dos critérios de divisibilidade por 9 e 3 vistos na aula passada.

Exemplo 6. Usando os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, construímos vários números de sete dígitos distintos. Existem dois deles, distintos, tais que um divide o outro?

Não. Suponha, por absurdo, que $m < n$ sejam dois desses números, com $m \mid n$. Claramente $m \mid n - m$ e $9 \mid n - m$, pois n e m possuem a mesma soma dos dígitos e conseqüentemente possuem o mesmo resto na divisão por 9. Por outro lado, sabemos a soma dos dígitos de m : $1 + 2 + \dots + 7 = 3 \cdot 9 + 1$. Daí, m não possui fator 9 e podemos garantir que $9m \mid n - m$. Mas então $9m \leq n - m \Rightarrow 10m \leq n \Rightarrow n$ tem pelo menos oito dígitos, uma contradição.

Exemplo 7. (Leningrado 1989) Seja A um número natural maior que 1, e seja B um número natural que é um divisor de $A^2 + 1$. Prove que se $B - A > 0$, então $B - A > \sqrt{A}$.

Seja $B - A = q$. Assim, $A + q \mid A^2 + 1$. Como $(A - q)(A + q) = A^2 - q^2$ é divisível por $A + q$, podemos concluir que $A + q \mid [(A^2 + 1) - (A^2 - q^2)] = q^2 + 1$. Pela propriedade de limitação, $A + q \leq q^2 + 1$. Nessa desigualdade, não podemos ter $q = 1$ pois $A > 1$. Usando então que $q > 1$, temos $A \leq q^2 - q + 1 < q^2$, ou seja, $\sqrt{A} < q$.

Problema 8. (AIME 1986) Qual é o maior inteiro n para o qual $n^3 + 100$ é divisível por $n + 10$?

Para achar explicitamente o quociente de $n^3 + 100$ por $n + 10$ podemos fazer uso de alguma fatoração. Utilizaremos a soma dos cubos $n^3 + 10^3 = (n + 10)(n^2 - 10n + 100)$. Como,

$$n^3 + 100 = (n + 10)(n^2 - 10n + 100) - 900,$$

podemos concluir que o número 900 deve ser múltiplo de $n + 10$. O maior inteiro n para o qual $n + 10$ divide 900 é 890. Veja que se $n = 890$, o quociente da divisão de $n^3 + 100$ por $n + 10$ é $n^2 - 10n + 100 - 1 = 890^2 - 10 \cdot 890 + 99$.

Exemplo 9. (Extraído de [1]) Encontre todos os inteiros positivos n tais que $2n^2 + 1 \mid n^3 + 9n - 17$.

Utilizando o “ $2n^2 + 1$ divide” para reduzir o grau de $n^3 + 9n - 17$, temos que

$$\begin{cases} 2n^2 + 1 \mid n^3 + 9n - 17 \\ 2n^2 + 1 \mid 2n^2 + 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow 2n^2 + 1 &\mid (n^3 + 9n - 17) \cdot 2 + (2n^2 + 1) \cdot (-n) \\ \Leftrightarrow 2n^2 + 1 &\mid 17n - 34 \end{aligned}$$

Como o grau de $17n - 34$ é menor do que o de $2n^2 + 1$, podemos utilizar a “limitação” para obter uma lista finita de candidatos a n . Temos $17n - 34 = 0 \Leftrightarrow n = 2$ ou $\mid 2n^2 + 1 \mid \leq \mid 17n - 34 \mid \Leftrightarrow n = 1, 4$ ou 5. Destes candidatos, apenas $n = 2$ e $n = 5$ são soluções.

Exemplo 10. (Leningrado 1990) Sejam a e b números naturais tais que $b^2 + ba + 1$ divide $a^2 + ab + 1$. Prove que $a = b$.

Pela propriedade de limitação, $b^2 + ba + 1 \leq a^2 + ab + 1$ e daí $b \leq a$. Além disso, $b^2 + ab + 1 > a - b$. A igualdade $b(a^2 + ab + 1) - a(b^2 + ba + 1) = b - a$ implica que $a - b$ é divisível por $b^2 + ba + 1$. Se $a - b \neq 0$, então $b^2 + ab + 1 \leq a - b$. Mas isso é um absurdo, logo $a - b = 0$.

1.1 Problemas Propostos

Problema 11. Mostre que se $3 \mid a + 7b$ então $3 \mid a + b$.

Problema 12. Mostre que se $7 \mid a + 3b$ então $7 \mid 13a + 11b$

Problema 13. Mostre que se $19 \mid 3x + 7y$ então $19 \mid 43x + 75y$

Problema 14. Mostre que se $17 \mid 3a + 2b$ então $17 \mid 10a + b$

Problema 15. Encontre todos os inteiros positivos n tais que $n + 2009$ divide $n^2 + 2009$ e $n + 2010$ divide $n^2 + 2010$.

Problema 16. Seja $n > 1$ e k um inteiro positivo qualquer. Prove que $(n - 1)^2 \mid (n^k - 1)$ se, e somente se, $(n - 1) \mid k$.

Problema 17. (OBM 2005) Prove que a soma $1^k + 2^k + \dots + n^k$, onde n é um inteiro e k é ímpar, é divisível por $1 + 2 + \dots + n$.

Problema 18. O número de seis dígitos $X = \overline{abcdef}$ satisfaz a propriedade de que $\overline{abc} - \overline{def}$ é divisível por 7. Prove que X também é divisível por 7.

Problema 19. (Bielorússia 1996) Inteiros m e n , satisfazem a igualdade

$$(m - n)^2 = \frac{4mn}{m + n - 1}$$

a) Prove que $m + n$ é um quadrado perfeito.

b) Encontre todos os pares (m, n) satisfazendo a equação acima.

Problema 20. (Olimpíada de Leningrado) Os números naturais a , b e c têm a propriedade que a^3 é divisível por b , b^3 é divisível por c e c^3 é divisível por a . Prove que $(a + b + c)^{13}$ é divisível por abc .

Problema 21. (OBM 2000) É possível encontrar duas potências de 2, distintas e com o mesmo número de algarismos, tais que uma possa ser obtida através de uma reordenação dos dígitos da outra? (Dica: Lembre-se do critério de divisibilidade por 9)

Problema 22. (IMO 1998) Determine todos os pares de inteiros positivos (x, y) tais que $xy^2 + y + 7$ divide $x^2y + x + y$.

1.2 Dicas e Soluções

11. Como $3 \mid 6b$, segue que $3 \mid [(a + 7b) - 6b] = a + b$.

12. Como $7 \mid a + 3b$, segue que $7 \mid 13a + 39b = (13a + 11b) + 28b$. Mas $7 \mid 28b$, portanto $7 \mid [(13a + 11b) + 28b - 28b] = 13a + 11b$.

13. Como $19 \mid 3x + 7y$, segue que $19 \mid 27(3x + 7y) = (43x + 75y) + (38x + 114y)$. Mas $19 \mid 19(2x + 6y)$, portanto $19 \mid [(43x + 75y) + (38x + 114y) - 19(2x + 6y)] = 43x + 75y$.

14. Como $17 \mid 3a + 2b$, segue que $17 \mid 27a + 18b = (10a + b) + 17(a + b)$.

16. Veja que

$$\frac{n^k - 1}{(n - 1)^2} = \left(\frac{n^{k-1} - 1}{n - 1} + \frac{n^{k-2} - 1}{n - 1} + \dots + \frac{n - 1}{n - 1} + \frac{k}{n - 1} \right)$$

Como os números $\frac{n^l - 1}{n - 1}$ sempre são inteiros, o número do lado esquerdo da equação será inteiro se, e somente se, o número $\frac{k}{n - 1}$ for inteiro.

17. Comece dividindo o problema quando em dois casos: n é par ou n é ímpar. Sabemos que $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n + 1)}{2}$. Para n ímpar, basta mostrar que o número em questão é divisível por n e $\frac{n + 1}{2}$. O próximo passo é lembrar do problema 33 da aula 1. Pela fatoração de $x^n + y^n$, temos que $i^k + (n - i)^k$ é divisível por n . Faça outros tipos de pares para mostrar a divisibilidade por $\frac{n}{2}$. O caso quando n é par é análogo.

18. Veja que $X = 10^3 \cdot \overline{abc} + \overline{def} = 1001\overline{abc} - (\overline{abc} - \overline{def})$. Como 1001 é múltiplo de 7, concluímos que X é a soma de dois múltiplos de 7.

19. Somando $4mn$ em ambos os lados, obtemos:

$$\begin{aligned} (m + n)^2 &= \frac{4mn}{m + n - 1} + 4mn \\ &= \frac{4mn(m + n)}{m + n - 1} \Rightarrow \\ (m + n) &= \frac{4mn}{m + n - 1} \\ &= (m - n)^2 \end{aligned}$$

Assim, $m + n$ é o quadrado de um inteiro. Se $m - n = t$, então $m + n = t^2$ e $(m, n) = \left(\frac{t^2 + t}{2}, \frac{t^2 - t}{2}\right)$. É fácil verificar que para qualquer t inteiro esse par é solução do problema.

20. Analise a expansão pelo binômio de Newton.

21. Não. Suponha, por absurdo, que existam duas potências de 2, $2^m < 2^n$, satisfazendo o enunciado. Como 2^n é um múltiplo de 2^m , podemos ter: $2^n = 2 \cdot 2^m, 4 \cdot 2^m, 8 \cdot 2^m, \dots$. Além disso, como ambos possuem a mesma quantidade de dígitos, temos $1 < \frac{2^n}{2^m} < 10$. Assim, as únicas possibilidades são $2^n = 2 \cdot 2^m, 4 \cdot 2^m, 8 \cdot 2^m$. Pelo critério de divisibilidade por 9, como 2^m e 2^n possuem os mesmos dígitos, podemos concluir que $2^n - 2^m$ é um múltiplo de 9. Entretanto, nenhuma das possibilidades anteriores satisfaz essa condição e chegamos em um absurdo.

22. Começaremos usando a idéia do exemplo 10. A igualdade $y(x^2y + x + y) - x(xy^2 + y + 7) = y^2 - 7x$ implica que $y^2 - 7x$ é divisível por $xy^2 + y + 7$. Se $y^2 - 7x \geq 0$, como $y^2 - 7x < xy^2 + y + 7$, segue que $y^2 - 7x = 0$. Assim, $(x, y) = (7t^2, 7t)$ para algum $t \in \mathbb{N}$. É fácil checar que esses pares são realmente soluções. Se $y^2 - 7x < 0$, então $7x - y^2 > 0$ é divisível por $xy^2 + y + 7$. Daí, $xy^2 + y + 7 \leq 7x - y^2 < 7x$, que nos permite concluir que $y \leq 2$. Para $y = 1$, temos $x + 8 \mid 7x - 1$ e conseqüentemente $x + 8 \mid 7(x + 8) - (7x - 1) = 57$. Então as únicas possibilidades são $x = 11$ e $x = 49$, cujos pares correspondentes são $(11, 1), (49, 1)$. Para $y = 2$, temos $4x + 9 \mid 7x - 4$ e conseqüentemente $7(4x + 9) - 4(7x - 4) = 79$ é divisível por $4x + 9$. Nesse caso, não obtemos nenhuma solução nova. Todas as soluções para (x, y) são: $(7t^2, 7t)(t \in \mathbb{N}), (11, 1)$ e $(49, 1)$.

1.3 Referências

Referências

- [1] F. E. Brochero Martinez, C. G. Moreira, N. C. Saldanha, E. Tengan - Teoria dos Números um passeio com primos e outros números familiares pelo mundo inteiro, Projeto Euclides, IMPA, 2010.
- [2] E. Carneiro, O. Campos and F. Paiva, Olimpíadas Cearenses de Matemática 1981-2005 (Níveis Júnior e Senior), Ed. Realce, 2005.
- [3] S. B. Feitosa, B. Holanda, Y. Lima and C. T. Magalhães, Treinamento Cone Sul 2008. Fortaleza, Ed. Realce, 2010.
- [4] D. Fomin, A. Kirichenko, Leningrad Mathematical Olympiads 1987-1991, MathPro Press, Westford, MA, 1994.
- [5] D. Fomin, S. Genkin and I. Itenberg, Mathematical Circles, Mathematical Words, Vol. 7, American Mathematical Society, Boston, MA, 1966.
- [6] I. Niven, H. S. Zuckerman, and H. L. Montgomery, An Introduction to the Theory of Numbers.